

| | 病名 | 主な症状 | 出席停止期間 | 提出書類 |
|-------------------------------|--|---|--|--|
| 第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ | | 治癒するまで出席停止 | ・診断書 ・学校感染症罹患届 |
| | 新型コロナウイルス感染症 | <ul style="list-style-type: none"> 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある 重症化のリスクがある人で、発熱や咳等の比較的軽い風邪症状がある 発熱や咳等軽い風邪症状が4日以上続いている 嗅覚・味覚症状を有している | 医師・保健所からの登校許可が出るまで | <ul style="list-style-type: none"> 学校感染症罹患届 COVID-19に関する経過記録 体温測定記録 |
| 第二種 | インフルエンザ | 急な発熱、頭痛、腰痛、関節痛、全身倦怠感、咳、鼻水、のどの痛み | 発症後5日経過し、かつ解熱後2日を経過するまで | <ul style="list-style-type: none"> 診断書の代わりに薬剤情報提供文書(薬の説明書)・検査結果・診療明細でも可 学校感染症罹患届 |
| | 百日咳 | はじめは軽い咳やのどの発赤、その後、コンコンという短く激しい咳を繰り返す | 特有の咳が消失するまで または5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで | |
| | 麻疹(はしか) | 発熱、咳、鼻水、目やに、結膜充血、頬の内側に白い斑点(コプリック斑)ができる 発熱後4日目より皮膚に発疹 | 解熱後3日を経過するまで | |
| | 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 微熱(37-38℃)、片側～両側のおごの後ろが大きく腫れて痛む(押ししたり、咬んだりすると痛い)、 食欲不振・嚥下困難 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後、5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
| | 風疹(三日ばしか) | 発熱と同時に発疹、耳の後ろ・首・わきの下などのリンパ節が腫れる 咳・結膜充血 | 発疹が消失するまで | <ul style="list-style-type: none"> 診断書 学校感染症罹患届 |
| | 水痘(みずぼうそう) | 微熱・全身倦怠感とともに、水泡のあるかゆみを伴う発疹が背中・腹部から全身に次々できる。 かさぶたとなり、先に出たものから治っていく | すべての発疹が痂皮化(かさぶた)するまで | |
| | 咽頭結膜熱(プール熱) | 発熱、のどの痛み、結膜充血、首のリンパ節が腫れる | 主要症状が消失した後、2日を経過するまで | |
| | 結核 | 初期は自覚症状なし。胸部レントゲン検査で見られることが多い。 疲労感、寝汗、微熱、咳、痰、体重減少、肩こり | 医師が感染の恐れがないと認めるまで | |
| | 髄膜炎菌性髄膜炎 | 高熱(38℃以上)、頭痛、吐き気・嘔吐、首が硬い、頭がぼーっとする | 医師が感染の恐れがないと認めるまで | |
| 第三種 | コレラ | 突然の下痢(米のとぎ汁様)、嘔吐、脱水症状(とくに流行地への海外旅行後) | | |
| | 細菌性赤痢 | 急激な発熱、下痢(水様)、腹痛(しぶり腹)、血便(とくに流行地への海外旅行後) | | |
| | 腸管出血性大腸菌感染症(O-157) | 激しい腹痛のあと、下痢(水様)、吐き気・嘔吐、悪寒、血便 | | |
| | 腸チフス | 高熱が続く、発疹(淡紅色の斑点)、比較的徐脈(高熱の割に脈拍が遅い)、脾腫(脾臓が腫れる) (とくに流行地への海外旅行後) | | |
| | パラチフス | | | |
| | 流行性角結膜炎 | 眼の異物感、涙がよく出る、目やに、結膜充血 | | |
| | 急性出血性結膜炎 | 眼の痛み、きつい充血、出血してくる | | |
| | その他の感染症(医師による出席停止の指示があった場合) | | 医師が感染の恐れがないと認めるまで | |
| | マイコプラズマ感染症 | かわいた激しい咳が続く、発熱、のどの痛み | *第三種のその他の感染症については、医師により診断されたうえで、他者への感染性が強いと判断された場合には出席停止とする。 | <ul style="list-style-type: none"> 診断書 学校感染症罹患届 |
| | 溶連菌感染症 | のどの痛み(扁桃腺が赤く腫れる、白苔がつく)、高熱 | | |
| | 急性ウイルス性肝炎 | 発熱、全身倦怠感、吐き気・嘔吐、黄疸(白目や皮膚が黄色くなる) | | |
| | 伝染性紅斑(りんご病) | 両頬に少し盛り上がった蕁麻疹様の発疹、手足の網目状の紅斑、発熱、手足の関節の腫れ・痛み、微熱 | | |
| | 手足口病 | 微熱、のどの痛み、口の中や手足に水泡ができる | | |
| ヘルパンギーナ | 高熱、のどの痛み、口の中(のどの奥)に水泡・潰瘍ができる | | | |
| 感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など) | 嘔吐、下痢(水様)、発熱、腹痛 | | | |
| EBウイルス感染症 | 軽いかぜ症状ですむことが多いが、伝染性単核症になると、発熱、首のリンパ節が腫れる、のどの痛み(扁桃腺が赤く腫れる)、ウイルス性肝炎の症状(全身倦怠感、吐き気・嘔吐、黄疸など)も | | | |